

INSTRUCCIONES DE COLONOSCOPIA Suprep
Trate de evitar las frutas y verduras durante 2 días antes de la colonoscopia.

Medicamentos que se deben suspender CINCO días antes del procedimiento: los anticoagulantes con aspirina, Plavix (clopidogrel), Coumadin (warfarina), Xarelto y NSAID (por ejemplo, Motrin, Advil, Naproxen, Celebrex, Ibuprofen) requerirían autorización (lo correcto es parado) de MD que prescribe.

INSTRUCCIÓN ES PARA EL DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA:

En la mañana antes de las 8:00am puede comer un desayuno liviano ejemplo un huevo revuelto, hervido, una tostada.

Debe permanecer en una dieta de líquida (LIQUIDOS TRANSPARENTES) todo el día antes de su procedimiento. **NO DEBE CONSUMIR NINGUN ALIMENTO SOLIDO.**

Los líquidos claros incluyen: agua, jugos de fruta colados (sin pulpa) incluyendo manzana, uva blanca o arándano blanco, limonada o limonada, café o té (no use leche / crema, puede usar azúcar o limón), caldo de pollo, soda, Gatorade (amarillo solamente), paletas (no rojo), gelatina (no rojo). Por favor no consuma productos lácteos ni nada de color rojo.

A las 4:00pm. Vacíe 1 botella de la preparación líquido en un recipiente de 16 onzas que se suministrara. Agregue agua potable fría o Gatorade a la línea marcada en el recipiente. Beba el contenido dentro de 1 hora puede usar una pajilla o pajita. (No use pajilla o pajita si es un paciente bariátrico)

Beba 32 onzas de agua corriente durante las próximas 3 horas.

Al las 8:00 p.m. REPITA LAS MISMAS INSTRUSCCIONES DE LAS 4:00 P.M.

SI SU PROCEDIMIENTO ES EN LA TARDE 12:00PM O MAS TARDE DURANTE EL DIA SIGA LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

A las 8: p.m. Vacíe 1 botella de la preparación líquido en un recipiente de 16 onzas que se suministrara. Agregue agua potable fría o Gatorade a la línea marcada en el recipiente. Beba el contenido dentro de 1 hora puede usar una pajilla o pajita. (No use pajilla o pajita si es un paciente bariátrico)

Beba 32 onzas de agua corriente durante las próximas 3 horas.

A las 6:00am. REPITA LAS MISMAS INTRUCCIONES DE LAS 8:P. M.

No tome nada por la boca durante este tiempo (incluyendo comida, agua, productos con tabaco, goma de mascar, dulces)

EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA:

No coma o beba nada después de la medianoche. Los medicamentos deben tomarse DESPUÉS de que el procedimiento haya terminado, con la excepción de los siguientes ... Tome SÓLO sus medicamentos para la presión arterial, el corazón y las convulsiones con un pequeño sorbo de agua. Cualquier pregunta, por favor llame a la oficina al 860-522-1171